

2019年11月27日
武田テバファーマ株式会社

用法・用量の追加承認取得に関するお知らせ ピタバスタチンカルシウム錠 1mg・2mg「テバ」

武田テバファーマ株式会社(本社:愛知県名古屋市、CEO 兼社長:松森 浩士)は、ピタバスタチンカルシウム錠 1mg・2mg「テバ」につきまして、本日 11 月 27 日付で下記の用法・用量の追加承認を取得しましたのでお知らせします。

今回の追加承認取得により、用法・用量が先発医薬品と同一になります。

記

用法及び用量	<p><u>高コレステロール血症</u> 通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-Cコレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。</p> <p><u>家族性高コレステロール血症</u> 成人:通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-Cコレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。 小児:通常、10歳以上の小児にはピタバスタチンカルシウムとして1mgを1日1回経口投与する。 なお、症状により適宜増減し、LDL-Cコレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日2mgまでとする。</p>
--------	--

(下線は変更箇所を示す)

以上